

リンパ腫

管理	療法名	使用抗癌剤（投与量）	1クール	癌腫	対象
BM-019	ムンデシン療法	ムンデシンカプセル(300mg/回)		末梢性T細胞リンパ腫	再発・難治性
BM-023	ベンダムスチン療法（90）	トレアキシシ(90mg/m ²)	28日	非ホジキンリンパ腫	未治療の低悪性度/マントル細胞型
BM-025	イムブルピカ療法	イムブルピカカプセル(小リンパ球性リンパ腫:420mg/body、マントル細胞リンパ腫:560mg/body)		小リンパ球性リンパ腫・マントル細胞リンパ腫	再発・難治性
BM-035	アドセトリス療法	アドセトリス(1.8mg/kg)	21日	ホジキンリンパ腫・未分化大細胞リンパ腫	再発・難治性/CD30陽性
BM-036	Dose-Adjusted EPOCH療法	ベプシド(50mg/m ²) ドキシソルピシシ(10mg/m ²) オンコピン(0.4mg/m ²) エンドキサシ(750mg/m ²) ブレドニゾロン錠(60mg/m ²)	21日	悪性リンパ腫	再発
BM-038	GDP療法(21日間)	ジェムザール(1000mg/m ²) シスプラチシ(75mg/m ²) デキサート(39.6mg/body)	21日	悪性リンパ腫	治療抵抗性
BM-045	ゾリンザ療法	ゾリンザカプセル(400mg/body)		皮膚T細胞性リンパ腫	再発・難治性
BM-048	ボテリジシ療法	ボテリジシ(1mg/kg)	28日	成人T細胞白血病リンパ腫・末梢性T細胞リンパ腫・皮膚T細胞性リンパ腫	再発・難治性
BM-050	ABVd療法	ドキシソルピシシ(25mg/m ²) ブレオ(9mg/m ²) エクザール(6mg/m ²) ブレドニシ(40mg/body) ダカルバジシ(250mg/m ²)	28日	ホジキンリンパ腫	
BM-0511	PEE療法	ベプシドカプセル(25～50mg/body) エンドキサシ錠(50mg/body) ブレドニゾロン錠(10mg/body)	28日	非ホジキンリンパ腫	小リンパ球性/マントル細胞型/辺縁帯型/T細胞型
BM-0512	PEP療法	塩酸プロカルバジシカプセル(50mg/body) エンドキサシ錠(50mg/body) ブレドニゾロン錠(10mg/body)	28日	非ホジキンリンパ腫	小リンパ球性/マントル細胞型/辺縁帯型/T細胞型
BM-052	リツキサシ療法	リツキサシ(375mg/m ²)	7日	非ホジキンリンパ腫	CD20陽性B細胞型

リンパ腫

管理	療法名	使用抗癌剤（投与量）	1クール	癌腫	対象
BM-053	FCAP療法	ドキシソルピシン(40mg/m ²) エンドキササン(1000mg/m ²) フィルデシン(3mg/body) プレドニン(60mg/m ²) プレドニゾロン錠(40～100mg/body)	21日	非ホジキンリンパ腫	低中悪性度
BM-054	CHOP療法	ドキシソルピシン(50mg/m ²) エンドキササン(750mg/m ²) オンコピン(1.4mg/m ²) プレドニン(100mg/body) プレドニゾロン錠(40～100mg/body)	21日	非ホジキンリンパ腫	低中悪性度
BM-055	THP-COP療法	テラルピシン(40mg/m ²) エンドキササン注(750mg/m ²) オンコピン(1.4mg/m ²) プレドニン(60mg/m ²) プレドニゾロン錠(40～100mg/body)	21日	非ホジキンリンパ腫	低中悪性度
BM-0561	M L 5 1クール	ドキシソルピシン(40mg/m ²) エンドキササン(1000mg/m ²) フィルデシン(3mg/body) プレドニン(60mg/m ²)	28日～	非ホジキンリンパ腫	中悪性度の病期 以上 成人T細胞性白血病リンパ腫/末梢性T細胞リンパ腫/T前駆細胞リンパ芽球性リンパ腫
BM-0562	M L 5 2クール	ノバントロン(8mg/m ²) エンドキササン(400mg/m ²) ベプシド(100mg/m ²) プレドニン(60mg/m ²) 塩酸プロカルバジンカプセル(100mg/m ²)	28日～	非ホジキンリンパ腫	中悪性度の病期 以上 成人T細胞性白血病リンパ腫/末梢性T細胞リンパ腫/T前駆細胞リンパ芽球性リンパ腫
BM-0563	M L 5 3クール	ドキシソルピシン(40mg/m ²) エンドキササン(1000mg/m ²) フィルデシン(3mg/body、1mg/body) プレドニン(60mg/m ²)	28日～	非ホジキンリンパ腫	中悪性度の病期 以上 マントル細胞型、辺縁帯型、成人T細胞性白血病リンパ腫/末梢性T細胞リンパ腫/T前駆細胞リンパ芽球性リンパ腫
BM-0564	M L 5 4クール	メソトレキセート(2000mg/m ²) シタラピン(3000mg/m ²) × 2 プレドニン(100mg/body)	28日～	非ホジキンリンパ腫	中悪性度の病期 以上 末梢性T細胞リンパ腫/T前駆細胞リンパ芽球性リンパ腫

リンパ腫

管理	療法名	使用抗癌剤（投与量）	1クール	癌腫	対象
BM-0565	M L 5 5クール	ノバントロン(8mg/m ²) エンドキサン(400mg/m ²) ベプシド(130mg/m ²) プレドニン(60mg/m ²)	28日～	非ホジキンリンパ腫	中悪性度の病期 以上 末梢性T細胞リンパ腫/T前駆細胞 リンパ芽球性リンパ腫
BM-0571	M C L・M Z L プロトコル 1クール	オンコビン(0.5mg/body) ドキソルピシン(10mg/m ²) デキサート(39.6mg/body) エンドキサン(1000mg/m ²)	28日	非ホジキンリンパ腫	辺縁帯型/マントル細胞型
BM-0574	M C L・M Z L プロトコル 4クール	ドキソルピシン(40mg/m ²) エンドキサン(300mg/m ²) フィルデシン(1mg/body) プレドニン(60mg/m ²)	28日	非ホジキンリンパ腫	辺縁帯型/マントル細胞型
BM-0581	Burkitt induction療法	フィルデシン(1mg/body) メソトレキセート(2000mg/m ²) エンドキサン(600mg/m ²) プレドニン(60mg/m ²)	28日	非ホジキンリンパ腫	Burkitt型
BM-0582	Burkitt A療法	メソトレキセート(3000mg/m ²) ドキソルピシン(40mg/m ²) エンドキサン(1000mg/m ²) フィルデシン(3mg/body 1mg/body) プレドニン(60mg/m ²) メソトレキセート(15mg/body) キロサイド(40mg/body) プレドニン(40mg/body)	28日	非ホジキンリンパ腫	Burkitt型
BM-0583	Burkitt B療法	メソトレキセート(2000mg/m ²) ドキソルピシン(40mg/m ²) エンドキサン(300mg/m ²) フィルデシン(1mg/body) プレドニン(60mg/m ²) メソトレキセート(15mg/body) キロサイド(40mg/body) プレドニン(40mg/body)	28日	非ホジキンリンパ腫	Burkitt型

リンパ腫

管理	療法名	使用抗癌剤（投与量）	1クール	癌腫	対象
BM-061	VAD療法	オンコピン(0.5mg/body) ドキシソルピシン(9mg/m ²) デキサート(39.6mg/body)	28日	非ホジキンリンパ腫	再発・難治性
BM-063	エトポシド大量療法	ベプシド(500mg/m ²) プレドニン(100mg/body)	7日	非ホジキンリンパ腫	自家末梢血幹細胞移植前処置
BM-068	メルファラン大量療法(PBSCT)	アルケラン(100mg/m ²)	28日	悪性リンパ腫	末梢血幹細胞移植
BM-069	THPFCAP療法	テラルピシン(40mg/m ²) エンドキサソ(1000mg/m ²) フィルデシン(3mg/body) プレドニン(60mg/m ²) プレドニゾロン錠(60mg/body)	21日	非ホジキンリンパ腫	低中悪性度
BM-070	シクロホスファミド大量療法(50)	エンドキサソ(50mg/kg) デキサート(39.6mg/body)	2日	悪性リンパ腫	自家末梢血幹細胞移植の幹細胞採取前処置
BM-072	CHASE療法	エンドキサソ(1200mg/m ²) シタラピン(2000mg/m ²) ベプシド(100mg/m ²) デキサート(39.6mg/body)	21日	非ホジキンリンパ腫	中・高悪性度/再発・難治性
BM-073	DeVIC療法	イホマイド(1500mg/m ²) カルボプラチン(300mg/m ²) ベプシド(100mg/m ²) デキサート(39.6mg/body)	21日	非ホジキンリンパ腫	中・高悪性度/再発・難治性
BM-075	WTHPFCAP療法	テラルピシン(40mg/m ²) フィルデシン(3mg/body、1mg/body) エンドキサソ(1000mg/m ²) プレドニン(60mg/m ²)	28日	非ホジキンリンパ腫	再発・難治性
BM-082	FCP療法	フルグラ(25mg/m ²) エンドキサソ(300mg/m ²) プレドニン(60mg/m ²)	28日	悪性リンパ腫	再発・難治性
BM-085	ロイナーゼ療法	ロイナーゼ(5000U/body) プレドニン(60mg/m ²)	14日	悪性リンパ腫	難治性リンパ芽球性

リンパ腫

管理	療法名	使用抗癌剤（投与量）	1クール	癌腫	対象
BM-091	GDP療法(28日間)	ジェムザール(1000mg/m ²) シスプラチン(100mg/m ²) デキサート(39.6mg/body)	28日	悪性リンパ腫	治療抵抗性
BM-093	ベンダムスチン療法	トレアキシン(120mg/m ²)	21日	非ホジキンリンパ腫	再発/難治性の低悪性度/マントル細胞型
BM-094	ICE療法(リンパ腫)	イホマイド(3g/m ²) カルボプラチン(400mg/m ²) ベプシド(200mg/m ²) プレドニン(100mg/body)	4日	悪性リンパ腫	移植前処置
BM-098	M L 5 1クール(THP)	テラルピシン(40mg/m ²) エンドキサン(1000mg/m ²) フィルデシン(3mg/body) プレドニン(60mg/m ²)	28日	非ホジキンリンパ腫	中悪性度の病期 以上 成人T細胞性白血病リンパ腫/末梢性T細胞リンパ腫/T前駆細胞リンパ芽球性リンパ腫
BT-081	シクロホスファミド大量療法	エンドキサン(60mg/kg)	2日	悪性リンパ腫	造血細胞移植前処置
L-060	オブジーボ療法	オブジーボ(3mg/kg)	14日	ホジキンリンパ腫	再発又は難治性
Z-930	ラニムスチン療法	サイメリン(50～90mg/m ²)	42～56日	悪性リンパ腫	