



末梢血幹細胞採取を受けられる () さま

主治医は、 _____ です
 病棟師長は、 _____ です
 担当看護師は、 _____ です

	入院日(採取前日)	入院2日目(採取1日目)			入院3日目(採取2日目)			退院日
		採取前	採取中	採取後	採取前	採取中	採取後	
月・日・曜日	/ ()	/ ()			/ ()			/ ()
食事・栄養	普通食	普通食		昼: 遅食 夕: 普通食	普通食		昼: 遅食 夕: 普通食	普通食
安静度	自由に活動できます	トイレを済ませ、看護師とフェレーシス室まで歩いて行きます	採取中はベッド上安静です 採取のため医師が両腕に針を刺します 採取中は両腕をのばしたままとなります トイレにいきたくなったら、ベッド上排泄のお手伝いをします	採取後は病棟から看護師が車いすで、お迎えにきます	トイレを済ませ、看護師とフェレーシス室まで歩いて行きます	採取中はベッド上安静です 採取のため医師が両腕に針を刺します 採取中は両腕をのばしたままとなります トイレにいきたくなったら、ベッド上排泄のお手伝いをします	採取後は病棟から看護師が車いすで、お迎えにきます	
清潔	入浴できます			採取2時間後より入浴できます			採取2時間後より入浴できます	
治療・点滴・服薬	白血球の数を増やすための注射をします 就寝前に安定剤を処方します	採取開始2時間前くらいに白血球の数を増やすための注射をします	採取は約4-5時間くらいかかります	時間おきに、血圧測定などで看護師が訪室します 血小板の値により返血することがあります		採取は約4-5時間くらいかかります	時間おきに、血圧測定などで看護師が訪室します 血小板の値により返血することがあります	
処置	入院時、体重測定があります 蓄尿を開始します リストバンドをつけます	朝、体重測定があります	血圧計や心電図モニターを装着し、定期的に観察します 終了後、抜針して圧迫止血します	体重測定をします 抜針後30分したら、圧迫止血テープを除去します	朝、体重測定があります	血圧計や心電図モニターを装着し、定期的に観察します 終了後、抜針して圧迫止血します	体重測定をします 抜針後30分したら、圧迫止血テープを除去します	
検査	手の甲から採血があります	朝、手の甲から採血があります		腹部エコー検査があります	朝、手の甲から採血があります			朝、採血があります
説明・指導	看護師による説明 薬の副作用の有無についてお伺いします 本日の予定・入院中の日課・病室案内 主治医による説明 明日の採取の説明をします		採取中に手足や口唇がしびれることがあります 看護師にお知らせください	採取の結果で翌日の採取の有無を決定します	採取がなければ、午前中に主治医の診察後、退院になります	採取中に手足や口唇がしびれることがあります 看護師にお知らせください	午前中に主治医の診察後、退院になります	

* 病状に応じて、予定は変更になる場合があります。ご不明な点がございましたら、担当看護師におたずねください。