



日本赤十字社

末梢血幹細胞採取(注射開始日入院)を受けられる ()さま

主治医は、 _____ です
病棟師長は、 _____ です
担当看護師は、 _____ です

月・日・曜日	入院日(注射開始日)	入院2日目~4日目	入院5日目(採取1日目)			入院6日目(採取2日目)			退院日
			採取前	採取中	採取後	採取前	採取中	採取後	
食事・栄養	普通食	普通食	普通食		昼:遅食 夕:普通食	普通食		昼:遅食 夕:普通食	普通食
安静度	自由に活動できます	自由に活動できます	トイレを済ませ、看護師とフェレーシス室まで歩いて行きます	採取中はベッド上安静です 採取のため医師が両腕に針を刺します 採取中は両腕をのばしたままとなります トイレにいきたくなったら、ベッド上排泄のお手伝いをします	採取後は病棟から看護師が車いすでお迎えにきます	トイレを済ませ、看護師とフェレーシス室まで歩いて行きます	採取中はベッド上安静です 採取のため医師が両腕に針を刺します 採取中は両腕をのばしたままとなります トイレにいきたくなったら、ベッド上排泄のお手伝いをします	採取後は病棟から看護師が車いすでお迎えにきます	
清潔	制限はありません	制限はありません			採取後2時間後よりシャワー可能(制限なし)			採取後2時間後よりシャワー可能(制限なし)	
治療・点滴・服薬	白血球の数を増やすための注射をします 就寝前に安定剤を処方します	白血球の数を増やすための注射をします 就寝前に安定剤を処方します	採取開始2時間前くらいに白血球の数を増やすための注射をします	採取は約4-5時間くらいかかります	時間おきに、血圧測定などで看護師が訪室します 血小板の値により返血することがあります	採取は約4-5時間くらいかかります	時間おきに、血圧測定などで看護師が訪室します 血小板の値により返血することがあります		
処置	入院時、体重測定があります リストバンドをつけます	朝、体重測定があります	朝、体重測定があります	血圧計や心電図モニターを装着し、定期的に観察します 終了後、抜針して圧迫止血します	体重測定をします 抜針後30分したら、圧迫止血テープを除去します	朝、体重測定があります	血圧計や心電図モニターを装着し、定期的に観察します 終了後、抜針して圧迫止血します	体重測定をします 抜針後30分したら、圧迫止血テープを除去します	
検査	手の甲から採血があります	手の甲から採血があります	朝、手の甲から採血があります		腹部エコー検査があります	朝、手の甲から採血があります			朝、採血があります
説明・指導	看護師による説明 薬の副作用の有無についてお伺いします 本日の予定・入院中の日課・病室案内 主治医による説明 注射・採取の説明をします			採取中に手足や口唇がしびれることがあります 看護師にお知らせください	採取の結果で翌日の採取の有無を決定します	採取がなければ、午前中に主治医の診察後、退院になります	採取中に手足や口唇がしびれることがあります 看護師にお知らせください	午前中に主治医の診察後、退院になります	

* 病状に応じて、予定は変更になる場合があります。ご不明な点がございましたら、担当看護師におたずねください。