

## 扁桃摘出術を受けられる ( ) さま

	入院日 ~ 手術前日	手術日 /	( )	手術後1日目	手術後2日目	手術後3日目	手術後4日目	手術後5日目	退院日
月·日·曜日	/ ( )	手術前	手術後	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )	/ ( )
食事・栄養	普通食		翌日の朝まで食べれません。医師の許可がでたら、飲水できます。術後最初の飲水は看護師が見守ります。	朝:流動食 昼:3分粥	昼~5分粥	昼~全粥		昼~普通食 状態に応じて変更します	食物によっては痛みや出血の原因となりますので、補食・間食の際は必ずご相談ください
排 泄		医師の許可がでたら歩いてトイレに行くことができます。 とができます。 それまではベッド上の排泄になります。 術後、初めての歩行の時は看護師が付 き添います。							
安静度	自由に活動できます		それまではベッド上の排泄になります。 術後、初めての歩行の時は看護師が付 き添います。 ベッド上で安静に過ごしましょう。 医師の指示により、トイレ歩行できます。	安静に過ごしましょう。 外出は医師の許可が必要です 激しい運動は2週間はさけましょう					
傷(のど)の状態				かさぶたができます 早い人では3日目頃より徐々にはがれてきますので、1週間目頃が一番出血しやすい時期					1しやすい時期です
身体の清潔	手術前日にシャワー浴・洗髪をして下さい	シャワー浴はできません。		発熱や出血がなければシャワー浴できます 長湯は避けましょう					
口の中の清潔		歯みがき、うがいを済ませ、口の中を清潔にし ておきましょう	麻酔が覚めたらオキシドール含嗽水 でうがいを始めましょう(翌朝までに 1本使い切りましょう)	起床時、毎食後、間食後、就寝前に必ずうがいを行いましょう 間食したあとも必ずうがいをしまし 風邪予防のため退院後も続けましょう				たあとも必ずうがいをしましょ	
治療・点滴・服薬		午前中に点滴を行います	点滴を行います	抗生物質の点滴 を、朝(9時頃)と 夕(16時頃)に行 います 医師の指示があれば、点滴が内服薬に変わ				れば、点滴が内服薬に変わり	IJ≢ŧ
	物品の準備	トイレを済ませたあと、手術着に着がえ、弾性 ストッキングをはきます(看護師が準備します)	酸素マスクをつけます しっかり深呼吸してください	毎日午前中に、耳鼻科処置室で診察を行います(金曜日のみ午後となります)				<b>なります</b> )	【退院日】 8時45分から、
処 置	ティッシュ 弾性ストッキングのサイズを測定します。		血液は飲み込まずに出して下さい 血のついたティッシュはビニール袋に入れて下さい		朝食後外来へおいでください。(外来の看護				耳鼻科外来診察室にて部長回診を行います 朝食後外来へおいでください。(外来の看護師に声をかけてください)
									※ 水曜日・土曜日・日曜日は病棟で回診を行います
検 査									Con Con
説明・指導	さい・本日の予定・入院中の日課・週課・病棟案内を行います	て下さい  ヘアピンを外し、髪の長い方は結髪しておいて	痛みについて・・・・・喉や耳に痛みがあれり 食事の際の痛みを軽 出血について・・・・・血液は飲み込まず、吐 ベッドサイドにビニーノ 入れてください 赤い!	い喉や耳に痛みがあれば、我慢せず早めに知らせて下さい 食事の際の痛みを軽くするために、食事開始30分~1時間前に、痛み止めを服用しましょう ・・血液は飲み込まず、吐き出すようにしましょう ベッドサイドにビニール袋を備え付けておりますので、その中に血液や唾液を取ったティッシュを 入れてください 赤い血液が続くようであれば、看護師に知らせてください いがって痰を出したり、喉に力が入るような行為は避けましょう					