



日本赤十字社

末梢血幹細胞採取(前日入院)を受けられる ( )さま  
(持続型G-CSF製剤)

)さま

主 治 医 は、\_\_\_\_\_ です  
病 棟 師 長 は、\_\_\_\_\_ です  
担当看護師 は、\_\_\_\_\_ です

	入院3日前	入院日(採取前日)	入院2日目(採取1日目)			入院3日目(採取2日目)			退院日
			採取前	採取中	採取後	採取前	採取中	採取後	
月・日・曜日	／ ( )	／ ( )	／ ( )	／ ( )	／ ( )	／ ( )	／ ( )	／ ( )	／ ( )
食事・栄養		普通食	普通食		昼:遅食 夕:普通食	普通食		昼:遅食 夕:普通食	普通食
安 静 度		自由に活動できます	トイレを済ませ、看護師とフェレーシス室まで歩いて行きます	採取中はベッド上安静です 採取のため医師が両腕に針を刺します 採取中は両腕をのばしたままとなります トイレにいきたくなったら、ベッド上排泄のお手伝いをします	採取後は病棟から看護師が車いすで、お迎えにきます	トイレを済ませ、看護師とフェレーシス室まで歩いて行きます	採取中はベッド上安静です 採取のため医師が両腕に針を刺します 採取中は両腕をのばしたままとなります トイレにいきたくなったら、ベッド上排泄のお手伝いをします	採取後は病棟から看護師が車いすで、お迎えにきます	
清 潔		制限はありません			採取後2時間後より シャワー可能(制限なし)			採取後2時間後より シャワー可能(制限なし)	
治療・点滴・服薬	外来にて白血球の数を増やすための注射をします	就寝前に安定剤を処方します		採取は約4-5時間くらいかかります	時間おきに、血圧測定などで看護師が訪室します 血小板の値により返血することがあります		採取は約4-5時間くらいかかります	時間おきに、血圧測定などで看護師が訪室します 血小板の値により返血することがあります	
処 置	入院時、体重測定があります  リストバンドをつけます	朝、体重測定があります	血圧計や心電図モニターを装着し、定期的に観察します  終了後、抜針して圧迫止血します	体重測定をします  抜針後30分したら、圧迫止血テープを除去します	朝、体重測定があります	血圧計や心電図モニターを装着し、定期的に観察します  終了後、抜針して圧迫止血します	体重測定をします  抜針後30分したら、圧迫止血テープを除去します		
検 査	手の甲から採血があります	朝、手の甲から採血があります		腹部エコー検査があります	朝、手の甲から採血があります				朝、採血があります
説 明	看護師による説明 薬の副作用の有無についてお伺いします 本日の予定・入院中の日課・病室案内 主治医による説明 明日の採取の説明をします		採取中に手足や口唇がしびれることがあります 看護師にお知らせください	採取の結果で翌日の採取の有無を決定します	採取がなければ、午前中に主治医の診察後、退院になります	採取中に手足や口唇がしびれることがあります 看護師にお知らせください		午前中に主治医の診察後、退院になります	

\* 病状に応じて、予定は変更になる場合があります。ご不明な点がありましたら、担当看護師におたずねください。

2025年10月作成 広島赤十字・原爆病院