




日本赤十字社

末梢血幹細胞採取(前日入院)を受けられる () さま
(連日型G-CSF製剤)

主治医は、 _____ です
病棟師長は、 _____ です
担当看護師は、 _____ です

	入院日(採取前日)	入院2日目(採取1日目)			入院3日目(採取2日目)			退院日
		採取前	採取中	採取後	採取前	採取中	採取後	
月・日・曜日	/ ()	/ ()			/ ()			/ ()
食事・栄養	普通食 	普通食 		昼:遅食 夕:普通食 	普通食 		昼:遅食 夕:普通食 	普通食 
安 静 度	自由に活動できます	トイレを済ませ、看護師とフェレーシス室まで歩いて行きます	採取中はベッド上安静です 採取のため医師が両腕に針を刺します 採取中は両腕をのばしたままとなります トイレにいきたくなったら、ベッド上排泄のお手伝いをします	採取後は病棟から看護師が車いすで、お迎えにきます	トイレを済ませ、看護師とフェレーシス室まで歩いて行きます	採取中はベッド上安静です 採取のため医師が両腕に針を刺します 採取中は両腕をのばしたままとなります トイレにいきたくなったら、ベッド上排泄のお手伝いをします	採取後は病棟から看護師が車いすで、お迎えにきます	
清 潔	制限はありません			採取後2時間後よりシャワー可能(制限なし)			採取後2時間後よりシャワー可能(制限なし)	
治療・点滴・服薬	白血球の数を増やすための注射をします  就寝前に安定剤を処方します	採取開始2時間前くらいに白血球の数を増やすための注射をします 	採取は約4-5時間くらいかかります 	時間おきに、血圧測定などで看護師が訪室します 血小板の値により返血することがあります		採取は約4-5時間くらいかかります 	時間おきに、血圧測定などで看護師が訪室します 血小板の値により返血することがあります	
処 置	入院時、体重測定があります  リストバンドをつけます	朝、体重測定があります	血圧計や心電図モニターを装着し、定期的に観察します 終了後、抜針して圧迫止血します	体重測定をします 抜針後30分したら、圧迫止血テープを除去します 	朝、体重測定があります	血圧計や心電図モニターを装着し、定期的に観察します 終了後、抜針して圧迫止血します 	体重測定をします 抜針後30分したら、圧迫止血テープを除去します	
検 査	手の甲から採血があります	朝、手の甲から採血があります		腹部エコー検査があります	朝、手の甲から採血があります			朝、採血があります
説明・指導	看護師による説明  薬の副作用の有無についてお伺いします 本日の予定・入院中の日課・病室案内 主治医による説明  明日の採取の説明をします		採取中に手足や口唇がしびれることがあります 看護師にお知らせください	採取の結果で翌日の採取の有無を決定します 	採取がなければ、午前中に主治医の診察後、退院になります 	採取中に手足や口唇がしびれることがあります 看護師にお知らせください 	午前中に主治医の診察後、退院になります 	

* 病状に応じて、予定は変更になる場合があります。ご不明な点がございましたら、担当看護師におたずねください。 